

La Bartonelosis o Verruga peruana

La Bartonelosis, Verruga Peruana o “Enfermedad de Carrión” es una enfermedad infecciosa transmitida al hombre por el zancudo “*Lutzomía sp*” (foto de la derecha) conocido como “manta blanca” o “titira” que al picar infecta los glóbulos rojos y los destruye.



TIPOS DE BARTONELOSIS

Bartonelosis Aguda: que pueda provocar la muerte de la persona, se manifiesta con fiebre alta e irregular, anemia progresiva y severa. En la población de las zonas endémicas la fase aguda en algunos casos puede tener manifestaciones leves. En las formas graves y complicadas se manifiestan con somnolencia, delirio, agitación, estado de coma y complicaciones generales.

Bartonelosis Verrucosa: es la presencia de verrugas en la piel o mucosas, rojizas y/o sangrantes, distribuidas en miembros, caras y otras partes del cuerpo. A veces está acompañada de dolores en las articulaciones, sangrado, picazón e infección. Las personas de las zonas endémicas pueden tener estas lesiones que se presentan con o sin síntomas asociados, e inclusive con resultados negativos en los exámenes, pero son portadores de la enfermedad.

VÍAS DE TRASMISIÓN

- Por la picadura del zancudo (mosquito, manta blanca o titira).
- Por transfusión con sangre infectada.

SINTOMAS

Una vez que el mosquito infectado pica a una persona transcurren 10 días para que se presenten los primeros síntomas, en casos excepcionales pueden demorar varios meses. Los principales síntomas de la Bartonelosis Aguda son: Fiebre y palidez como expresión de una anemia aguda, en estos casos es necesario el diagnóstico para iniciar el tratamiento. Pueden haber otros síntomas secundarios como: dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular.

Otros de las formas en que se manifiesta la enfermedad es la verrucosa, que no es mortal, en la que aparecen lesiones (verrugas), esta tiene implicancias para la transmisión, ya que la persona enferma se constituye en un portador.

QUÉ HACER

Si presenta los síntomas debe acudir inmediatamente al establecimiento más cercano para que le tomen una muestra de sangre y se diagnostique de manera precoz, la Bartonelosis. Si es definido como caso iniciará el tratamiento gratuito de 10 días otorgado por el Ministerio de Salud.

PREVENCIÓN: Los que visitan las zonas endémicas deben tener en cuenta que: el insecto es nocturno, nunca aparece en el día, por lo que es necesario evitar frecuentar su hábitat (chacras, charcos, excrementos, etc.). Utilizar repelentes, usar camisa manga larga, usar mosquiteros para dormir. En general deben evitar la exposición.



Limpeza casa por casa para eliminar el mosquito